대 복 피
(大 腹 皮)
Areca Peel

Arecae Pericarpium

이 약은 빈랑 (檳榔) *Areca catechu* Linné (야자과 Palmae)의 열매껍질로서 열매를 삶은 다음 벗겨낸 것이다. 덜 익은 열매에서 얻은 것을 대복피 (大腹皮)라 하고 잘 익은 열매에서 얻은 것을 대복모 (大腹毛)라 한다.

성 상 대복피 (大腹皮) 이 약은 열매껍질로 대개 타원형 또는 긴 난형의 표주박 모양이며, 길이 4 ~ 7 cm, 너비 20 ~ 35 cm, 두께 2 ~ 5 mm이다. 외과피는 진한 갈색 ~ 흑색에 가깝고, 불규칙한 세로주름과 튀어나온 가로 무늬가 있으며, 맨 윗부분에는 암술대 자국이 있고 기부에는 열매꼭지 및 꽃받침 조각이 남아 있다. 내과피는 오묵하게 들어갔고 갈색 또는 진한 갈색이며 광채가 나고 매끄러우며 단단한 껍질모양이다. 몸체는 가볍고 질은 단단하며 세로로 찢으면 중과피의 섬유를 볼 수 있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 약간 떫다.

대복모 (大腹毛) 이 약은 열매껍질로 대개 타원형 또는 표주박 모양이다. 외과피는 대부분 이미 탈락했거나 남아있기도 하다. 중과피는 종려털 모양이고 황백색 또는 연한 갈색이며 성글고 질은 유연하다. 내과피는 딱딱한 껍질 모양이고 황갈색 ~ 진한 갈색이다. 내표면은 광채가 나고 매끄러우며 때로 세로 방향으로 찢겨져있다.

이 약은 약간 특유한 냄새가 있고 맛은 담담하다.

확인시험 이 약의 가루 0.5 g을 달아 물 5 mL를 넣어 2 ~ 3분간 흔들어 섞은 다음 여과한 여액 2 mL에 아세트산납시액 1 mL를 넣을 때 액은 연한 황색으로 혼탁하고 천천히 연한 황색의 침전이 생긴다.

순도시험 이물 이 약은 빈랑자와 이물이 10.0 % 이상 섞여 있지 않다.

건조감량 12.0 % 이하 (6 시간).

회 분 7.0 % 이하.

엑스함량 묽은에탄올엑스 5.0 % 이상.